

LEISHMANIOSE DE PONTA NASAL

JOÃO D C GURGEL; ANDRÉ M PORTUGAL; FERNANDO H A FREITAS;
KRISHNAMURTI M A SARMENTO JUNIOR

Área/Area: RHINOLOGY, ALLERGY AND FACIAL PLASTIC SURGERY

Forma de Apresentação/Presentation Type: POSTER

Sessão/Session: 375

Data/Date: 2/6/2009

Hora Inicial/Initial Time: 08:30:00

Hora Final/Final Time: 17:30:00

Código do Trabalho/Paper Code: PO-02-375

INTRODUCTION

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença que acompanha o homem desde a antiguidade, existindo relatos e descrições encontrados na literatura desde o séc. I d.C. Em seus hospedeiros vertebrados, as Leishmanias apresentam-se sob a forma amastigota e são transmitidas por vetores, os mosquitos flebotomíneos, do gênero *Lutzomyia*.

A maioria dos casos com acometimento nasal descritos na literatura dizem respeito à forma mucosa ou cutâneo-mucosa.

As opções de tratamento disponíveis atualmente apresentam taxas de resposta clínica satisfatórias. O medicamento mais estudado para este fim até os dias de hoje é o antimoniató pentavalente.

OBJECTIVES

Relatar um caso de Leishmaniose na ponta do nariz, na forma cutânea localizada.

MATERIAL & METHODS

Paciente de 23 anos de idade, sexo feminino, branca, trabalhadora rural, procurou atendimento médico com queixa de lesão em ponta do nariz, inicialmente similar a uma “espinha” (acne), que posteriormente evoluiu para forma úlcero-crostosa, com episódios de sangramento de pequena monta, iniciada há dois meses. Havia comparecido a quatro serviços diferentes e sido medicada com antibióticos por via oral como cefalexina, azitromicina, ciprofloxacina e amoxicilina, além de pomadas com associações de antibacteriano/antifúngico sem melhora. Nenhuma alteração da mucosa nasal foi observada à endoscopia nasal. Diante da história e das características da lesão foi realizada de imediato a biópsia para análise histopatológica.

RESULTS

Após a análise histopatológica foi possível observar a presença de inúmeras amastigotas de *Leishmania braziliensis*. A paciente foi então encaminhada para tratamento com antimoniató pentavalente por via intramuscular com regressão completa da lesão.

CONCLUSION

A apresentação cutânea exclusiva da leishmaniose é incomum, sobretudo nos acometimentos faciais, quando a realização de biópsia para diagnóstico torna-se de extrema importância.